

## BIÓPSIA DE PRÓSTATA

O objetivo de uma biópsia é colher material de uma lesão ou de um órgão do corpo para ser avaliado por um médico especialista. Dessa forma, é possível obter informações precisas sobre a natureza das lesões ou o grau de comprometimento de um tecido por doenças. Este procedimento é realizado sob efeito de anestesia local para reduzir o desconforto durante o procedimento.

Siga as orientações e tire suas dúvidas com antecedência. Caso não siga as orientações, seu exame não poderá ser efetuado.

- Trazer exames de imagem anteriores referente a próstata.
- Trazer solicitação médica
- Documentos pessoais
- Vir acompanhado
- Chegar 20 minutos antes do horário agendado
- Trazer último exame realizado de PSA
- Trazer exames de coagulação de no máximo 7 dias de antecedência da data do exame (TS, TC, TAP TTPA e Plaquetas)
- Não fazer uso de ASS/ ASPIRINA e anticoagulantes nos 10 dias que antecedem a biópsia
- **Não será realizada Biópsia sem exames prévios**
- Não suspender medicamentos anti-hipertensivos, diabetes
- Será necessário: 10 comprimidos de Ciprofloxacina 500mg 01 comprimido de Tylenol 500mg

**ANTIBIOTICOTERAPIA + ANALGESIA** O exame exige o uso de antibiótico profilático (**receita médica**):

01 comprimido de Ciprofloxacina 500mg de 12/12h durante cinco dias, iniciando dois dias antes do exame agendado.

**Não suspender medicamentos de rotina como anti-hipertensivos e diabetes.**

### ORIENTAÇÕES PÓS PROCEDIMENTO:

-Na primeira hora, ingerir bastante água. O paciente ficará em observação na clínica, não sendo recomendado ir embora dirigindo.

-O material retirado deve ser levado para o laboratório, pelo paciente, no prazo preferencial de 24 horas. Caso o paciente leve o material para casa manter na geladeira.

-Pode surgir um pequeno sangramento na urina, fezes ou ejaculação nos dias posteriores à biópsia. Caso persista o sangramento ou surja febre acima de 38°, deverá consultar o médico assistente / hospital.

**RISCO DE INFECÇÃO:**

O procedimento é realizado através do reto, tendo possibilidade de contaminação da próstata. Para diminuir o risco é obrigatório o uso do antibiótico de forma correta conforme a orientação.